

ที่ มส ๐๐๓๒.๐๐๖/๑ ๕๙๙



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ถนนขุนลุมประพาส มส ๕๘๐๐๐

๑๒ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้นเข็มที่ ๔ ในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
บุคลากรด่านหน้า และประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคเรื้อรัง การให้วัคซีนในเด็กอายุ ๕-๑๑ ปี และการให้
วัคซีนโควิด 19 เข็มที่ ๓ กรณีผู้ได้รับวัคซีนนอกสูตร

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอ ทุกอำเภอ
สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๔๑๐.๑๒/ว๑ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบการแพร่กระจายเชื้อ
ในวงกว้างประกอบกับการติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์เพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมาก จากการประชุมคณะอนุกรรมการ
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ และการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ
ฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ ๓๘๙ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม
๒๕๖๔ มีมติให้คำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้นเข็มที่ ๔ ในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
บุคลากรด่านหน้า และประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคเรื้อรัง และการให้วัคซีนในเด็กอายุ ๕-๑๑ ปี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงขอให้ดำเนินการตามหลักการในการ
ให้วัคซีนโควิด 19 เดือนมกราคม ๒๕๖๕ ตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๔๑๐.๑๒/ว๑ ลงวันที่
๔ มกราคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอกชัย คำลือ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

เลขที่รับ.....
วันที่ 10 ม.ค. 2565
เวลา 09.00 น.

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๔๑๐.๑๒/ว ๑



สำนักฯ นสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
เลขที่รับ 030
วันที่ 07 ม.ค. 2565
เวลา 13.58 น.

กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๕ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง แนวทางการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น เข็มที่ ๔ ในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข บุคลากร
ด้านหน้า และประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคเรื้อรัง การให้วัคซีนในเด็กอายุ ๕ - ๑๑ ปี และการให้วัคซีน
โควิด 19 เข็มที่ ๓ กรณีผู้ได้รับวัคซีนนอกสูตร

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบการแพร่กระจายเชื้อในวงกว้าง ประกอบกับมีการติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์กลายพันธุ์เพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมาก จากการประชุมคณะกรรมการ
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ และการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ
ฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ ๓๘๙ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔
มีมติให้คำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น เข็มที่ ๔ ในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
บุคลากรด้านหน้า และประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคเรื้อรัง และการให้วัคซีนในเด็กอายุ ๕ - ๑๑ ปี

กระทรวงสาธารณสุข จึงขอแจ้งคำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด 19 ดังนี้

๑. การฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น เข็มที่ ๔ ในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
บุคลากรด้านหน้า และประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคเรื้อรัง

๑.๑ บุคคลที่ได้รับวัคซีน Sinovac ครบ ๒ เข็ม และได้รับวัคซีน AstraZeneca เป็นเข็ม
กระตุ้นเข็มที่ ๓ กำหนดให้ได้รับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีน AstraZeneca หรือวัคซีน Pfizer หรือวัคซีน
Moderna จำนวน ๑ เข็ม โดยมีระยะห่าง ตั้งแต่ ๓ เดือนขึ้นไป หลังเข็มที่ ๓

๑.๒ บุคคลที่ได้รับวัคซีน Sinovac ครบ ๒ เข็ม และได้รับวัคซีน Pfizer เป็นเข็มกระตุ้น
เข็มที่ ๓ กำหนดให้ได้รับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีน Pfizer หรือวัคซีน Moderna จำนวน ๑ เข็ม โดยมี
ระยะห่าง ตั้งแต่ ๓ เดือนขึ้นไป หลังเข็มที่ ๓

๑.๓ การฉีดวัคซีน Pfizer เข็มกระตุ้นเข็มที่ ๔ แนะนำให้ฉีดโดสตามมาตรฐาน อย่างไรก็ตาม
หากมีผู้ประสงค์จะฉีดครั้งโดส หรือฉีดเข้าในผิวหนังให้เป็นไปตามดุลยพินิจของแพทย์ และความสมัครใจของ
ผู้รับวัคซีน

๑.๔ การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็มที่ ๔ ในกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับวัคซีนสูตรอื่นๆ ให้เป็นไป
ตามดุลยพินิจของแพทย์และความสมัครใจของผู้รับวัคซีน

๒. การให้วัคซีนโควิด 19 ในเด็กอายุ ๕ - ๑๑ ปี

๒.๑ การให้วัคซีนโควิด 19 ในเด็กอายุ ๕-๑๑ ปี ต้องเป็นวัคซีนที่ขึ้นทะเบียนกับทาง
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำหรับการฉีดในเด็กอายุ ๕-๑๑ ปี ตามขนาดและข้อบ่งใช้ที่กำหนด

๒.๒ การตัดสินใจให้เด็กเข้ารับวัคซีน ให้เป็นไปโดยความสมัครใจของผู้ปกครอง

๒.๓ กำหนดให้โรงเรียนเป็นสถานที่ฉีดวัคซีนหลัก ร่วมกับฉีดที่โรงพยาบาล โดยให้มีการทำความเข้าใจกับผู้ปกครองให้เห็นชอบก่อนให้เด็กเข้ารับวัคซีน

๒.๔ ควรมีการเตรียมความพร้อมอย่างรอบคอบ ไม่ควรรีบฉีดวัคซีนจนเกินไป
ทั้งนี้ จะมีการแจ้งแนวทางการดำเนินงานการให้วัคซีนโควิด 19 ในเด็กอายุ ๕ - ๑๑ ปี ในภายหลัง

๓. การให้วัคซีนโควิด 19 เข็มที่ ๓ กรณีผู้ได้รับวัคซีนนอกสูตร

๓.๑ บุคคลที่ได้รับวัคซีนนอกสูตร กำหนดให้วัคซีนเพิ่มเติมเข็มที่ ๓ เป็นวัคซีน Pfizer หรือวัคซีน Moderna จำนวน ๑ เข็ม โดยมีระยะห่าง ตั้งแต่ ๓ เดือน ขึ้นไป หลังเข็มที่ ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นายธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข

ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค

กองโรคติดต่อทั่วไป

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๓๑๕๖ - ๙

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๓๑๕๖ - ๙

เรียน นพ.สงวน แผล้องระดม

- กลุ่มงานศส. เน้นตรวจเชิงกลุ่มงานเพื่อเสริมสุขภาพ
- วันที่ ๒.๕ และ ๒.๖ ทุกวัน ๑๖.๐๐-๑๗.๐๐
- กำหนดการ ทบทวนมาตรการฉีดวัคซีนโควิด 19
- เพื่อโปรดพิจารณา

ธงชัย
(นายธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์)
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข



นพท



(นายเอกชัย คำลือ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน